

Aşılama: aşılarınız tam mı?

2016 basitleştirilmiş aşı takvimi

[illegible]



Daha fazla bilgi

“Aşıların tam olması” ne anlama gelmektedir?

“Aşıların tam olması”, yaşı ve korunmak için gerekli doğru aşılamaya sayısına göre önerilen aşıların yaptırılmış olmasıdır.

Aşıların “tam” değilse?

Hepsinin yeniden yaptırmaya gerek yoktur, aşının bırakıldığı aşamada aşıyı tekrar olmaya başlamak yeterlidir. “Yakalamaktan” bahsedilir.

**Aşı korunmayı
ve başkalarının
korunmasını sağlar.**

BCG (Verem aşısı)

Verem aşısı, doğum anından itibaren ve yüksek tüberküloz riski taşıyan bazı çocuklarda 15 yaşına kadar önerilir.

Difteri – Tetanos – Çocuk felci

Yetişkinlerde bundan böyle sabit yaşlarda yani 25 yaş, 45 yaş, 65 yaş ve sonrasında her on yılda bir tekrarlanması önerilir.

Boğmaca

Boğmaca aşısı 25 yaşında tekrarlanır. Bu aşı, 6 aylıktan küçük, henüz tamamen aşılanamayan bebeklere de koruma sağladığından, çocuk sahibi olmayı planlayanları özellikle ilgilendirir ; boğmaca aşısının son tekrarının üzerinden 10 yıldan fazla zaman geçtiyse, süten kesilmemiş bebeklerin çevresindekilerin yeniden aşılanmaları önerilir.

Hepatit B

Anne sütü alan küçük bebeklerin aşılanma yaşı 2 aylıktan itibaren başlamaktadır. Eğer aşı çocuğun birinci yaşına kadar yapılmamış ise 15 yaşına kadar yapılabilir (15 yaş dahil). 16 yaşından itibaren sadece Hepatit B riski taşıyan kişiler için önerilir.

Pnömonok

Anne sütü alan küçük bebeklerin aşılanma yaşı 2 aylıktan itibaren başlamaktadır. 24 ayın üzerindeki çocuklar için bu aşı özel durumlarda önerilir.

Meningokok C

Aşılamaya, 12 aylıktan itibaren önerilmektedir ve 24 yaşına kadar yaptırılabilir (24 yaş dahil).

Kızamık - Kabakulak- Kızamıkçık

Aşılamaya bütün çocuklar için, 16 ve 18 aylık arası yapılacak bir ikinci dozla birlikte 12 aylıktan önerilmektedir. 1980 yılından itibaren doğanlar için aşının tam olması iki dozun da alınmış olması anlamına gelir.

HPV aşısı Papillomavirus humain (HPV)

Aşılamaya 11 ile 14 yaş arası genç kızlara önerilir ve yaptırmamış olanlar 19 yaşına kadar yaptırılabilirler.

Grip

Aşılanmanın, risk taşıyan kişiler, 6 aylıktan itibaren çocuklar, hamile kadınlar ve 65 yaş ve üzeri herkes için her yıl yapılması önerilir.

Zona

Aşılamaya 65 ile 74 yaş arası kişilere önerilir.

**Bir sorunuz mu var? Bir öneriye mi ihtiyacınız var?
Bu konuda doktorunuz, ebeniz veya eczacınıza danışabilirsiniz.**

